



DERRUMAL® 300

300 mg EXTRACTO TOTAL DE INSAPONIFICABLES DE PALTA-SOJA

Composición:

Cada cápsula contiene:

Extracto total de insaponificables de PALTA-SOJA	300 mg
(Insaponificable de Palta 100 mg Insaponificable de Soja 200 mg)	
Silíce coloidal anhidra	7 mg
Butilhidroxitolueno	30 mcg
Gelatina c.s.p.	1 cápsula

ACCIONES FARMACOLÓGICAS Y TERAPÉUTICAS

Actúa sobre el tropismo del tejido conectivo.

INDICACIONES

En Reumatología: tratamiento sintomático de acción lenta de la osteoartritis (artrosis) de cadera y rodilla.

En Estomatología: tratamiento adyuvante de la periodontitis.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO

1 cápsula por día junto con alguna de las comidas. Tomar la cápsula con un vaso grande de agua.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este medicamento ha sido prescrito para una determinada situación por lo cual:

- No debe ser adaptado para otros casos.
- No debe recomendarse a otra persona.
- No debe ser utilizado una vez superada la fecha de vencimiento.

Puede observarse variaciones en el color naranja de las cápsulas: éstas no afectan la eficacia y seguridad del tratamiento.

El producto se presenta en la forma de cápsulas, elaboradas a partir de gelatina alimenticia dura. Las mismas se disuelven en el estómago o intestino y liberan el medicamento que contienen.

Excepto casos particulares, deben tragarse con abundante líquido.

Interacciones medicamentosas

No se describen interacciones riesgosas. Sin embargo, para evitar interacciones eventuales con otros medicamentos, es conveniente que el paciente comunique al médico acerca de cualquier otro tratamiento en curso.

Embarazo y Lactancia

No existen datos suficientes para evaluar un eventual efecto teratogénico o fetotóxico. Por consiguiente, no se recomienda su administración durante el embarazo y la lactancia.

REACCIONES ADVERSAS

Infrecuentes: Este medicamento puede ocasionar, en algunos pacientes, efectos molestos tales como regurgitaciones con olor lipídico, que pueden evitarse al ingerir las cápsulas junto con las comidas.

Excepcionalmente: se reportan casos de aumento de las enzimas hepáticas séricas (transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubina y gamma-glutamil transpeptidas).

Frecuencia desconocida: trastornos gastrointestinales como diarrea y dolor epigástrico.

SOBREDOSIFICACIÓN:

No se describe.

TODO MEDICAMENTO DEBE PERMANECER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Conservar en lugar fresco, preferentemente entre 4° y 25°C

Presentación

Envases con 15 y 30 cápsulas

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N° 45.240.

Elaborado por

Laboratorio EXPANSCIENCE

Rue des Quatre Filles 28230 Epernon - Francia



Distribuido por:

FINADIET S.A.C.I.F.I.

Hipólito Yrigoyen 3769/71 (C1208ABE)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel (011) 4981 - 5444 / 5744

Dirección Técnica: Leonardo Fullone, Farmacéutico.

www.finadiet.com.ar



Fecha última revisión: 26 de julio de 2010.